

**枯らす力のマックスロード**  
ROUNDUP MAXLOAD

**梅雨の雨、低温、乾燥**

進化した「トランゾーブテクノロジーⅡ」が  
土への安全性の高さはそのままに  
今までにない除草効果を実現！

\*悪条件が重なると、効果が劣る場合があります。  
\*突如の雨：散布1時間以内の降雨では効果が劣る場合があります。  
\*MAX：ラウンドアップマックスロードの略称。



★ 日産化学工業株式会社  
〒101-0054 東京都千代田区神田路町3丁目7番地1

**ラウンドアップ マックスロード**



**ラウンドアップ マックスロード** なら、泡状タイプの除草剤ノズルで  
**サッと散布。枯らす力が違います！**

散布



散布後



シロツメクサに100倍液を散布した例

**この位で  
十分です！**

白点が薬液付着跡  
※ラウンドノズル25使用

- ◎少量でも根まで枯らして長期防除。
- ◎薬量も少なく済み経済的。
- ◎歩く速さで広い面積に散布できる。


泡状散布には  
ラウンドノズル25を  
お勧めします。



あきらめていたしつこい雑草

# ラウンドアップ マックスロード®におまかせ下さい!

難防除雑草には・・・



やっかいな**スギナ**も  
根まで確実に枯らします。

※スギナが生え揃った時期に  
散布してください。  
※夏場の黒ずんだスギナには  
効果が劣ります。

**25倍液**

|      |      |       |
|------|------|-------|
| 北海道  | 6～9月 | ていねいに |
| 東北   | 5～6月 | ていねいに |
| 関東以西 | 4～6月 | ていねいに |



しつこい**クログワイ**  
の塊茎まで枯らします。

※稲刈跡の再生したクログワイに散布。  
もしくは稲を高刈りして散布。

**50倍液**

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 東日本 | 9～10月 | ていねいに |
| 西日本 | 9～11月 | ていねいに |



繁殖の早い  
**マルバツユクサ**も  
年2回、2年連用処理で  
根絶します。

※草丈30cm以下での  
処理に限ります。

**100倍液**

|                |      |       |
|----------------|------|-------|
| 年2回、2年連用で処理します |      |       |
| 1回目            | 5～6月 | ていねいに |
| 2回目            | 8～9月 | ていねいに |



■セリ

**50倍液**

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 東日本 | 5～11月 | ていねいに |
| 西日本 | 5～11月 | ていねいに |



■キシュウズメノヒエ

**50倍液**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| 東日本 | 8月から | ていねいに |
| 西日本 | 7～9月 | ていねいに |



■ハマスゲ

**50倍液**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| 東日本 | 7～9月 | ていねいに |
| 西日本 | 7～9月 | ていねいに |



■クズ

**50倍液**

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 東日本 | 8～10月 | ていねいに |
| 西日本 | 8～11月 | ていねいに |



■セイトカアワダチソウ

**50倍液**

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 東日本 | 8～10月 | ていねいに |
| 西日本 | 8～10月 | ていねいに |



■ヨシ・アシ・ススキ

**50倍液**

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 東日本 | 8～10月 | ていねいに |
| 西日本 | 8～9月  | ていねいに |



■ヤブガラシ

**50倍液**

|     |       |       |
|-----|-------|-------|
| 東日本 | 8～10月 | ていねいに |
| 西日本 | 6～10月 | ていねいに |



■チガヤ

**100倍液**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| 東日本 | 4月から | ていねいに |
| 西日本 | 5～7月 | ていねいに |



■ヨモギ

**100倍液**

|     |       |     |
|-----|-------|-----|
| 東日本 | 5月から  | ふつう |
| 西日本 | 4～11月 | ふつう |



■ギシギシ

**100倍液**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| 東日本 | 6月まで | ふつう   |
| 西日本 | 6月まで | ていねいに |



■ハルジオン

**100倍液**

|     |      |       |
|-----|------|-------|
| 東日本 | いつでも | ていねいに |
| 西日本 | いつでも | ていねいに |



■スズメノカタビラ

**100倍液**

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| 東日本 | いつでも | ふつう |
| 西日本 | いつでも | ふつう |

## ラウンドアップ マックスロード の使い方

登録内容をよくご確認の上  
お使いください。

### 希釈早見表 (必要な薬量)

| 倍率<br>水量 | 100倍  | 50倍   | 25倍   |
|----------|-------|-------|-------|
| 10ℓ      | 100ml | 200ml | 400ml |
| 20ℓ      | 200ml | 400ml | 800ml |
| 100ℓ     | 1ℓ    | 2ℓ    | 4ℓ    |

基本的な使い方

**100倍液**

雑草の生育期に散布します



スズメノカタビラ・  
ギシギシ・ヨモギ  
ハルジオン・チガヤ・  
タンポポ・メヒシバなど

しつこい多年生雑草には

**50倍液**

一般的には花芽形成期に  
散布します



ハマスゲ・クズ・  
キシュウズメノヒエ・  
セイトカアワダチソウ・  
ヤブガラシなど

あきらめていたスギナには

**25倍液**

北海道: 6～9月、東北: 5～6月、  
関東以西: 4～6月に、ていねいに散布



草丈20～30cmの時期  
しつとり丁寧に散布  
根まで枯らします。

**高い  
安全性**

ラウンドアップならではの、土への高い安全性を持ちます。  
雑草の茎葉にかからず土に落ちた成分は、処理後1時間以内のごく短時間で  
土の粒子に吸着し、その後微生物のエサとなって自然物に分解します。

ラウンドアップお客様相談窓口

**0120-209374**

ホームページ PC/ 携帯 <http://www.roundupjp.com>

携帯電話ウエブサイトからもラウンドアップ マックスロードの  
【作物別使用方法】がご確認いただけます。

