

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	使用量 / 10a当り		本剤の 使用回数	グリホサートを含む 農薬の総使用回数	
				薬量 (g/L)	希釈水量 (L)			
果樹類 (かんきつを除く)	-	一年生雑草	収穫 7 日前まで - 雑草生育期 -	250 ~ 500	通常散布 50 ~ 100	3 回以内	3 回以内	
かんきつ		多年生雑草		500 ~ 1000				
		一年生雑草		250 ~ 500	通常散布 50 ~ 100		5 回以内	
		多年生雑草		500 ~ 1000	少量散布 25 ~ 50			
水田作物 (水稲を除く)	-	一年生雑草	耕起 20 ~ 10 日前まで - 雑草生育期 -	250 ~ 500		1 回	2 回以内	
移植水稲								
直播水稲								
水田作物 (水田畦畔)	水田畦畔	多年生雑草	収穫 14 日前まで - 雑草生育期 -	500 ~ 1000	50 ~ 100	2 回以内	3 回以内	
水田作物 (水田刈跡)	水田刈跡	一年生雑草	雑草生育期	250 ~ 500		1 回	1 回	
		多年生雑草		500 ~ 1000				
水田作物、畑作物 (休耕田)	休耕田	一年生雑草		250 ~ 500		2 回以内	3 回以内	
		多年生雑草		500 ~ 1000				
豆類 (種実、ただし、だいず、らっかせいを除く)	-	一年生雑草	耕起前又は は種前まで - 雑草生育期 -	250 ~ 500	少量散布 25 ~ 50		2 回以内	2 回以内
だいず			は種 10 日以前 - 雑草生育期 -					
			は種後出芽前まで - 雑草生育期 -					
野菜類 (だいこん、えだまめ、ねぎ、たまねぎ、トマト、きゅうり、 なす、ほうれんそう、レタス、アスパラガス、オリーブ(葉)、 しゃくやく(葉用)、たらのぎ、びわ(葉)、にんじん、 ピーマン、とうがらし類、薬用にんじんを除く)		一年生雑草	耕起 7 日前まで - 雑草生育期 -	100	1 回	1 回		
えだまめ			は種後出芽前 - 雑草生育期 -	少量散布 25 ~ 50	3 回以内	3 回以内		
			ねぎ	耕起 7 日前まで - 雑草生育期 -			100	
たまねぎ				耕起又は定植 7 日前まで - 雑草生育期 -			少量散布 25 ~ 50	
トマト、きゅうり、なす、ほうれんそう レタス、アスパラガス、オリーブ(葉) しゃくやく(葉用)、たらのぎ、びわ(葉)		一年生雑草	耕起 7 日前まで - 雑草生育期 -	100			1 回	2 回以内
だいこん、にんじん、ピーマン、とうがらし類			耕起 7 日前まで - 雑草生育期 -	10 回以内 (1 年間に 2 回以内)				
薬用にんじん			100	1 回				
麦類 (小麦を除く)			100	3 回以内				
小麦		多年生雑草	500 ~ 750	50 ~ 100	3 回以内	3 回以内		
雑穀類		一年生雑草	耕起前又は 播種前まで - 雑草生育期 -	250 ~ 500	50 ~ 100	1 回	2 回以内	
いも類 (かんしょを除く)			耕起前 - 雑草生育期 -					100
かんしょ		一年生及び 多年生雑草	耕起前又は 播種前まで - 雑草生育期 -	250 ~ 500	50 ~ 100	2 回以内	2 回以内	
飼料用とうもろこし			播種後出芽前まで - 雑草生育期 -					
さとうきび	園場内の 周縁部	一年生雑草	収穫 30 日前まで - 雑草生育期 -	500 ~ 1000	少量散布 25 ~ 50	1 回	6 回以内	
茶	-	一年生雑草	摘採 7 日前まで - 雑草生育期 -	250 ~ 500			2 回以内	
牧草	牧野、草地 (更新・造成)	多年生雑草	更新・造成の 10 日以前 - 雑草生育期 -	500 ~ 1000	50	2 回以内	3 回以内	
		一年生及び 多年生雑草	は種 10 日前 ~ は種当日 耕起敷地後 - 雑草発生前期 -	250 ~ 500				
林木	造林地 (地ごしらえ)	ススキ、ササ類等の 多年生雑草 落葉雑草かん木	生育盛期以降 夏 ~ 秋期	1000	30	1 回	1 回	
つつじ類、つばき類	-	一年生雑草	雑草生育期	250 ~ 500	50 ~ 100	4 回以内	4 回以内	
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 道路、運動場、 宅地、のり面、 鉄道 等	多年生雑草		500	100	3 回以内	3 回以内	
		スギナ		1000				
				2000	50 ~ 100			

作物名	適用場所	適用雑草名	適用時期	希釈倍率	使用液量	使用方法	本剤の 使用回数	グリホサートを含む 農薬の総使用回数
林木	林地	クズ・フジ等の つる類	生育初期	原液 又は 2倍液	つる径 2cm以下 2.1~3.0 10 3.1~4.0 15 4.1~5.0 20 5.1cm以上 適宜増量	つる注入 処理	1回	1回
		落葉雑草かん木	生育期 (5~10月)		1 mL / 力所 樹径 10cm以下 10~20cm 2~3力所 20cm以上 4~8 10	立木注入 処理		
	林地 放置竹林	竹類	夏期	原液	5~10 mL / 本	竹箨注入 処理		

希 釈 倍 率

長く、
確 実 な
除 草 効 果

基本的な雑草
100倍液

頑固な雑草
50倍液

スギナ
25倍液

※ 適用作物毎に希釈倍率は異なります。

水量	サンフーロンの量			広さ
	100 倍	50 倍	25 倍	
5 L	50 mL	100 mL	200 mL	30 坪
10 L	100 mL	200 mL	400 mL	60 坪
20 L	200 mL	400 mL	800 mL	120 坪
50 L	500 mL	1 L	2 L	300 坪
100 L	1 L	2 L	4 L	600 坪



ご使用の際は製品ラベル記載の「適用作物と
使用方法」をよくご確認の上、ご使用下さい。

使用上の注意事項などについては、製品に
貼付されているラベルをご参照して下さい。

サンフーロン お客様相談窓口

ご質問、お問い合わせは

☎ 0120-014-052

🌐 <http://sunfulon.jp/>

ご家庭、農家のみなさまをサポートします

TAISEI 大成農材株式会社
広島県広島市
中区鉄砲町 7-8

No.1

14年連続

2004 農薬年度 ~ 2017 農薬年度
グリホサート イソプロピルアミン塩 41%
出荷実績



葉 から入って
根 まで枯らす

土に優しく
しっかり枯らす

使いやすい豊富なラインナップ





アミノ酸系の除草剤 葉から入って 根まで枯らします

成分 グリホサート イソプロピルアミン塩 41%
非選択制茎葉処理移行型
農林水産省登録 第18814号 除草剤



安心の 農林水産省登録品

品質・効果・安全性・残留性などの審査をクリアして、農林水産省から農薬登録を受けています。

- 急性毒性試験
 - 慢性毒性試験（発がん性試験等）
 - 薬効薬害試験
 - 残留性試験
- 厳しい審査をクリア

環境にも 安心・安全

人や動物、環境に対して毒性のない有効成分で作られているので安全でありながら、様々な雑草からスギナ、竹など根まで枯らします。土に落ちると除草効果を失うので、土壌汚染なく、種まき・苗の植付け前もご使用いただけます。

※一部、抵抗性雑草など枯れない・枯れにくい場合がございます。

豊富な 適用作物の登録

多くの作物に農薬登録があります。お庭や空き地だけでなく、畑や田んぼでもお使いいただけます。

- 野菜類
- 果樹類
- 麦類・雑穀類
- いも類
- 豆類
- 林木・樹木等
- 茶
- 牧草
- 水田作物
- 水田作物・畑作（休耕田）




諦めていた「スギナ」も

しつこいスギナもカンタンに、根まで枯らします

25倍液で

うすめて
まくだけ



地中で出芽前のスギナには効果がないので、10日おきに3回まくとより効果的です

草丈 15～30cm 位の時期

散布時期

夏季など生育期以外は効果が劣る場合がありますので、最適な使用時期にお使いください。

関東以西 5月頃

東北地域 6月頃

北海道 6～7月頃





根深く頑固な「竹」も

土壌汚染なく安心・安全に、根まで枯らします

処理時期
夏季
6～8月

注入処理
するだけ



品質・効果が高く、同レベルの除草剤よりもお求めやすい価格で経済的です。

ジェネリック農薬…ジェネリック医薬品と同様、先発品と成分・効果が同じで、消費者の価格面での負担を軽減する、農薬のこと

お求めやすい ジェネリック農薬