

ばれいしょの茎葉枯凋、果樹園の下草除草に!



レグロックス®



ばれいしょ収穫の頼れる必需品!



果樹にも
最適!



レグロックス®

syngenta®

シンジェンタ ジャパン株式会社

農薬をご使用の際は、ご購入先、または当社ウェブサイトなどで最新の登録内容をご確認ください。

®はシンジェンタ社の登録商標

■ レグロックスの特長

農林水産省登録 第22143号 有効成分:ジクワットジプロミド…31.8% 毒物及び劇物取締法:劇物

- **広葉雑草に対して高い効果を示します。**
- **速効的で、散布後雨が降っても安定した効果を発揮します。**
- **土壤に触れるとすばやく不活性化されるので、処理後すぐに作物の種子をまいたり、植付けをすることができます。**

■ ばれいしょの茎葉枯凋効果

● 茎葉枯凋効果 (%)

平成8年北海道根釧農業試験場

品 種:ワセシロ

植付期:6月4日

散布日:9月18日(黄変期初期)

薬 量:レグロックス10a当たり300ml処理


A剤10a当たり15kg処理

完全枯凋日

■ :レグロックス 9月23日(試験開始5日後)

■ :A剤 9月25日(試験開始7日後)

無処理 10月2日(試験開始14日後)



■ 効果が速い。接触型の除草剤です

散布後1日で効果が現れます。3日間でほとんどの雑草を枯らしめます。また、雨にも強く、散布30分後の降雨にも除草効果が安定しています。

■ 適用雑草名と使用方法

作物名	適用場所	適用雑草名	使用時期	10a当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	総使用回数*
				薬量 (ml)	希釈水量 (ℓ)			
果樹類	—	果樹園下草 一年生雑草	雑草生育期 但し、収穫30日前まで	300～ 500	70～100	5回 以内	雑草茎葉 散布	5回 以内
ばれいしょ		一年生雑草	雑草生育期 (黄変期～枯凋期) 但し、収穫14日前まで	200～ 300		2回 以内		2回以内 (茎葉枯凋は 1回以内)
麦類			雑草生育期 但し、は種5～10日前	400		1回		4回 以内
桑			雑草生育期 (春期発芽前又は夏切後)	300～ 500		3回 以内	植栽地を除く 樹木等の周辺地に 雑草茎葉散布	3回 以内
樹木等	公園、庭園、 堤とう、駐車場、 宅地、のり面 等	雑草生育期						

作物名	使用目的	使用時期	10a当り使用量		本剤の使用回数	使用方法	総使用回数*
			薬量 (ml)	希釈水量 (ℓ)			
ばれいしょ	茎葉枯凋	黄変期～枯凋期 但し、収穫14日前まで	200～ 300	70～100	1回	茎葉散布	2回以内 (茎葉枯凋は 1回以内)
		開花後30日～黄変期 (茎葉繁茂期) 但し、収穫14日前まで	300				

※)ジクワットを含む農薬の総使用回数

- 使用前にはラベルをよく読んでください。
- ラベルの記載以外には使用しないでください。
- 本剤は小児の手の届く所には置かないでください。
- 使用後の空容器は圃場等に放置せず適切に処理してください。

シンジェンタ ジャパン株式会社

〒104-6021 東京都中央区晴海1-8-10 オフィスタワーX 21階
<https://www.syngenta.co.jp>



※この印刷物の記載内容は2020年2月現在のものです。

2020年3月作成 (L2171 KF/TS)